

**TRENTO, A.A. 2019/20**  
**CORSO DI ALGEBRA A**  
**FOGLIO DI ESERCIZI # 1**

**Avvertenza.** Se un esercizio è indicato come *facoltativo*, vuole dire che non sarà fra gli esercizi obbligatori nelle provette.

*Esercizio 1.1* (Facoltativo). Si consideri quello che succede moltiplicando il numero 142857 per 1, 2, 3, 4, ... Si descriva quel che succede, si spieghi perché succede, e si produca almeno un altro esempio del genere.

*Esercizio 1.2* (Assolutamente facoltativo, non perdeteci tempo se avete altro da fare). Come ricordiamo dalla scuola (ed è scritto nelle note, e vedremo comunque almeno in parte durante il corso), ogni frazione si può scrivere come un numero decimale, che o termina, o è periodico (eventualmente con un antiperiodo).

Usando eventualmente adeguati strumenti di calcolo che potete trovare in rete, verificate il seguente sviluppo decimale

$$\frac{1}{9801} = 0.000102 \dots 9697990001 \dots$$

e così via ripetendo. L'omissione del gruppo 98 nello sviluppo *non* è un errore.

Spiegare. Trovare almeno un altro esempio simile.

*Esercizio 1.3.* Si *dimostri* che gli unici divisori di 1 in  $\mathbf{Z}$  sono 1 e  $-1$ . In altre parole, le uniche soluzioni dell'equazione  $x \cdot y = 1$ , per  $x, y \in \mathbf{Z}$  sono  $x = y = 1$ , e  $x = y = -1$ .

*Esercizio 1.4.*

(1) Siano  $a, b \in \mathbf{Z}$ . Si mostri che sono equivalenti

- (a)  $a \mid b$  e  $b \mid a$ ,
- (b)  $b = \pm a$  (intendo  $b = a$  o  $b = -a$ ),
- (c)  $\mathfrak{D}(a) = \mathfrak{D}(b)$ , ove

$$\mathfrak{D}(a) = \{x \in \mathbf{Z} : x \mid a\}.$$

(2) Siano  $a, b \in \mathbf{Z}$ . Si mostri che sono equivalenti

- (a)  $a \mid b$ ,
- (b)  $-a \mid b$ ,
- (c)  $a \mid -b$ ,
- (d)  $-a \mid -b$ .

*Esercizio 1.5.* Si mostri che

- (1) 1 e  $-1$  dividono ogni numero intero;
- (2) gli unici numeri interi che dividono ogni numero intero sono 1 e  $-1$ ;
- (3) gli unici divisori di 1 sono 1,  $-1$ ;
- (4) ogni numero intero divide 0;
- (5) 0 è l'unico numero intero che sia divisibile per ogni numero intero;
- (6) sia  $a \in \mathbf{Z}$ , e  $B \subseteq \mathbf{Z}$  un sottoinsieme *infinito* degli interi tale che  $b \mid a$  per ogni  $b \in B$ ; si mostri che  $a = 0$ ;

- (7) l'unico numero intero divisibile per 0 è 0 stesso;  
 (8) se  $b \mid a$ , allora esiste *unico*  $c \in \mathbf{Z}$  tale che  $a = bc$ , a meno che non sia  $b = 0$ .

*Esercizio 1.6.* Si dimostri il

*Teorema* (della divisione con resto). *Siano*  $a, b \in \mathbf{Z}$ , *con*  $b \neq 0$ .

*Si mostri che esistono unici*  $q, r \in \mathbf{Z}$  *tali che*

$$\begin{cases} a = bq + r, \\ 0 \leq r < |b|, \end{cases}$$

A lezione abbiamo visto come ottenere il caso generale partendo dal caso *elementare* quando  $a \geq 0$ ,  $b > 0$ . Cercate anche di dare una dimostrazione del caso elementare.

*Esercizio 1.7.* Siano  $a, b, c, d \in \mathbf{Z}$ , e sia  $a = b + c$ . Si dimostri che se  $d$  divide almeno due dei numeri  $a, b, c$ , allora divide anche il terzo.

(Come caso particolare si ha che se  $d$  divide  $b$  e  $c$ , allora  $d$  divide  $b + c$ .)

*Esercizio 1.8* (Lievissima variante del precedente, ma torna utile). Siano  $a, b, c, q \in \mathbf{Z}$ , e sia  $a = bq + c$ . Si dimostri che

- (1) se  $d$  divide  $a$  e  $b$ , allora divide  $c$ , e  
 (2) se  $d$  divide  $b$  e  $c$ , allora divide  $a$ .

In altre parole,  $\mathfrak{D}(a) \cap \mathfrak{D}(b) = \mathfrak{D}(b) \cap \mathfrak{D}(c)$ .

*Esercizio 1.9.* Sia  $a \neq 0$  un numero intero. Sia  $D = \mathfrak{D}(a)$  l'insieme dei divisori di  $a$ .

Consideriamo la funzione  $f$  definita su  $D \setminus \{0\}$  tale che  $f(x) = a/x$ . All'apparenza i valori di  $f$  sono numeri razionali.

Si mostri che in realtà  $f$  ha valori in  $D$ , ed è quindi una funzione biiettiva su  $D \setminus \{0\}$ .

In sostanza, quello che vuole dire questo esercizio è che i divisori di un numero intero  $a$  vanno a coppie. Infatti  $a = bc$  vuol dire sia  $b \mid a$  sia  $c \mid a$ .

*Esercizio 1.10.* Si indichino quoziente e resto delle divisioni con resto di  $a$  per  $b$ , ove  $a, b$  assumono i valori seguenti

a	b
-14	4
0	7
-1	7
-2	7
-3	7
-4	7
-5	7
-6	7
-1	1000
-1000	2000
-237	-1508

*Esercizio 1.11.* Si consideri l'affermazione:

Se  $a, b \in \mathbf{Z}$ , e  $b \mid a$ , allora  $b \leq a$ ,

Si mostri che l'affermazione, così come è scritta, è falsa. (Basta *un* esempio.) Si veda come aggiustarla.

(SUGGERIMENTO: E' grosso modo una questione di segni...)

*Esercizio 1.12.* Si dia la definizione di massimo comun divisore di due interi, e si mostri che l'algoritmo di Euclide, applicato ad intero  $a \geq b > 0$  richiede al più  $2 \log_2(b)$  divisioni con resto.

*Esercizio 1.13.* Si mostri che, con la definizione corretta, il massimo comun divisore fra 0 e 0 è 0.

*Esercizio 1.14.*

- (1) Si mostri che sono equivalenti, per  $a, b, d \in \mathbf{Z}$ :
  - (a)  $d$  è un massimo comun divisore di  $a$  e  $b$ ;
  - (b)  $\mathfrak{D}(a) \cap \mathfrak{D}(b) = \mathfrak{D}(d)$ .
- (2) Si mostri che se  $d$  è un massimo comun divisore di  $a$  e  $b$ , allora tutti e soli i massimi comun divisori di  $a$  e  $b$  sono  $d$  e  $-d$ .

*Esercizio 1.15.* Si mostri che

$$\mathfrak{D}(a) \cap \mathfrak{D}(b) = \mathfrak{D}(-a) \cap \mathfrak{D}(b) = \mathfrak{D}(a) \cap \mathfrak{D}(-b) = \mathfrak{D}(-a) \cap \mathfrak{D}(-b).$$

(In altre parole,  $\mathfrak{D}(a) \cap \mathfrak{D}(b) = \mathfrak{D}(|a|) \cap \mathfrak{D}(|b|)$ .)

Se ne deduca che nel calcolare il MCD di  $a, b \in \mathbf{Z}$ , ci si può sempre ridurre al caso in cui siano entrambi non negativi.

*Esercizio 1.16.* Per ognuna (o almeno qualcuna, diciamo  $\geq 3$ ) delle seguenti coppie  $(a, b)$ , usando l'algoritmo di Euclide, si trovi il massimo comun divisore  $d$  di  $a$  e  $b$ ;

a	b
55	34
89	55
957	115
10946	6766
9762	501
736	337